


**Instrucciones  
después de  
la atención y  
cuándo  
llamar**



**Después  
de ponerse  
en casa  
las  
píldoras en  
la vagina**

**El  
sangrado y  
los cólicos  
SON  
NORMALES**

- \* Algunas mujeres sangran un poco
- \* Algunas mujeres sangran más que durante el período
- \* Algunos coágulos pueden ser tan grandes como un limón



**SI ESTÁ MOJANDO  
más de **2** TOALLAS  
SANITARIAS  
GRANDES por hora  
POR MÁS DE  
**2** HORAS seguidas,**



**LLÁMENOS**

**SI TIENE CÓLICOS  
INTENSOS Y LAS  
PÍLDORAS PARA  
EL DOLOR no  
ayudan,**



**LLÁMENOS**

**TAMBIÉN PUEDE  
TENER ALGUNOS  
EFECTOS  
SECUNDARIOS:**

- \* Náuseas
- \* Vómitos
- \* Diarrea
- \* Mareo

**SI CUALQUIERA DE  
ESTOS SÍNTOMAS  
DURA MÁS DE  
24 HORAS**

- \* Vómitos
- \* Diarrea
- \* Temperatura mayor que 100.4



**LLÁMENOS**

**Si se siente  
preocupada y cree  
que necesita ir a  
la sala de  
emergencias (ER)**



**LLÁMENOS**

**LA FIEBRE Y  
LOS  
ESCALOFRÍOS  
son NORMALES  
el día en que toma  
el MISOPROSTOL**

**PERO SI TODAVÍA  
TIENE FIEBRE o  
ESCALOFRÍOS  
24 HORAS  
después de tomar  
MISOPROSTOL,**



**LLÁMENOS**

Puede comunicarse con el proveedor de guardia al teléfono **505-560-8899**. Este es un biper digital. Cuando escuche el sonido, deje un teléfono (con el código de área) a dónde lo pueden llamar, seguido por el signo de #. Si no recibe una llamada en 15 minutos, intente de nuevo. También puede llamar al teléfono **505-272-2111**. Este es el operador principal de University Hospital. Dígame que quiere hablar con el **residente de Ginecología de guardia**. El operador entonces conectará su llamada.